

Інструкція Пеловіт-Р Стоматологія

- Гінгівіт;
- Стоматит (афтозний, грибовий);
- Пародонтоз;
- При носінні зубних протезів (знімає біль, запалення і набряк, стимулює загоєння пошкоджень ясен);
- До і після операційних втручань ротової порожнини;
- Травми ротової порожнини;
- Зубний біль;
- Гіперестезія зубів;
- Для профілактики захворювань ротової порожнини
-

Надає протизапальний, бактерицидний, знеболювальний і противірусний ефект без побічних дій.

Склад

Повністю натуральний препарат. Містить Пеловіт-Р – органомінеральний комплекс біологічно активних речовин, екстрагованих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а також макро – та мікроелементи в природному співвідношенні.

Хімічний склад Пеловіт-Р

Водневий показник (pH) 7,72 Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм3 Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм3 Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм3 Натрій + 60,0 г/дм3 Калій + 0,9 г/дм3 Кальцій2+ 2,5 г/дм3 Магній2+ 8,03 г/дм3 Хлор – 91,2 г/дм3 Сульфати 2- 2,1 г/дм3 Карбонати2- 0,02 г/дм3 Бікарбонати – 0,317 г/дм3 Еп +289,0

Вміст макро- і мікроелементів Пеловіт-Р (мкг/г сухої речовини):

Al-0,78; B-29,7; Ba-0,99; Be-0,009; Br-224000; Ca-5998; Co-0,005; Cr-3,79;Cu-0,51; Fe-23,67; I-3320; K-3697; Li-3,988; Mg-34250; Mn-2,09; Na-264700; Ni-2,2; P-21,3; S-9,47; Si-7,47; Sr-277,6; Ti-0,08; Zn-0,55

Фармакологічні властивості

- Нормалізує та підтримує в нормальному фізіологічному стані слизову рота.
- Надає протизапальну, розсмоктуючу, протинабрякню, десенсибілізаційну, біостимуляційну дію.
- Підвищує опірність слизової оболонки рота до патогенних мікроорганізмів
- Стимулює місцевий клітинний, гуморальний імунітет та відновні процеси при поразках слизової оболонки рота

Показання

Зубний біль	Полоскання 4-8 разів на день. Курс лікування 5-15 днів або до повного зникненнязапальних явищ	Нормалізація чутливості та ліквідація причини болю.
Гінгівіт	Протизапальний ефект	
Стоматит (афтозний, грибовий)	Нормалізує імунну відповідь, видаляє виразкові прояви	
Інфікування альвеол	Має антибактеріальний ефект, загоює та зміцнює альвеоли	
До та після операційних втручань ротової порожнини	Ліквідує запальні набряки, Відновлює пошкоджені м'які тканини без рубців	
Травми ротової порожнини	Відновлює функціональність м'яких тканин ротової порожнини	
Гіперестезія	Зміцнює тканини зубів, нормалізує чутливість.	

зубів	Перешкоджає розвитку не каріозних поразок	
Глосит	Усуває патологічні віруси та бактерії, знімає запалення з язика	
Пародонтоз, пародонтит	Знімає свербіж та запалення ясен, захищає зубний корінь, перешкоджає кровоточивості ясен та утворенню зубного каменю.	
При носінні зубних протезів	Знімає біль, запалення, набряк, стимулює загоєння пошкоджених ясен	
Кандидоз порожнини рота та горлянки	Полоскання 4-8 разів на день. Лікування курсами, що повторюються, по 10-14 днів з 3-5 денними перервами до повного зникнення запальних явищ.	Підвищує імунітет, пригнічує патологічні грибки без побічних ефектів, створює сприятливі умови для формування здорової слизової оболонки.
Профілактика захворювань ротової порожнини	Полоскання теплим препаратом 1-2 рази на день курсами по 10-14 днів	Формує здорову флору та підвищує загальний та місцевий імунітет

Спосіб використання

Препарат призначений для полоскань, промивань, аплікацій та фізіотерапевтичних процедур. Можливе застосування у вигляді марлевих тампонів, просочених теплим препаратом, що накладаються на уражені ділянки слизової оболонки рота, ясен.

2 види полоскань:

- 1 мірна місткість – 1 раз, не розводячи, не змивати
- 1 мірний стакан розвести на стакан теплої води, полоскати горло та рот

Особливі вказівки

- Для осіб із підвищеною чутливістю препарат можна розводити 1:1.
- Дітям віком від 2 до 6 років можливе використання препарату у вигляді полоскань та аплікацій.
- Препарат повністю нешкідливий при попаданні на горло та в ШКТ для дорослих та дітей.

Застосування в педіатрії

Можна дітям у віці від 2 років.

Застосування при вагітності та лактації

Препарат ефективний та безпечний при лікуванні та профілактиці захворювань ротової порожнини у вагітних жінок та годуючих матерів

Протипоказання

не виявлено

Побічні ефекти

Не виявлено

Передозування

Не зафіксовано.

Зберігання

При температурі від +4° до +25°С.

Виробник: ТОВ Аксімед Україна **pelovit.com**