

Інструкція до застосування Пеловіт-Р Подолог

Pelovit-R Podology

Форма випуску

Препарат для зовнішнього застосування.

Склад

Екстракт лікувальної грязі 100%. Повністю натуральний препарат. Містить у своєму складі унікальний складний органомінеральний комплекс біологічно активних речовин з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а так само макро та – мікроелементи в природному співвідношенні.

Хімічний склад Пеловіта-Р

Водневий показник (pH) 7,72

Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм³

Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм³

Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм³

Натрій + 60,0 г/дм³

Калій + 0,9 г/дм³

Кальцій 2 + 2,5 г/дм³

Магній 2 + 8,03 г/дм³

Хлор-91,2 г/дм³

Сульфати 2 – 2,1 г/дм³

Карбонати 2 – 0,02 г/дм³

Бікарбонати-0,317 г/дм³

Еп + 289,0

Зміст макро та – мікроелементів (мкг / г сухої речовини)

Al – 0,78 мкг / г; B – 29,7 мкг / г; Ba – 0,99 мкг / г; Be – 0,009 мкг / г;

Br – 224000 мкг / г; Ca – 5998 мкг / г; Co -0,005 мкг / г; Cr – 3,79 мкг / г;

Cu – 0,51 мкг / г; Fe – 23,67 мкг / г; I – 3320 мкг / г; K – 3697 мкг / г;

Li – 3,988 мкг / г; Mg – 34250 мкг / г; Mn – 2,09 мкг / г; Na – 264700 мкг / г;

Ni – 2,2 мкг / г; P – 21,3 мкг / г; S – 9,47 мкг / г; Si – 7,47 мкг / г;

Sr – 277,6 мкг / г; Ti – 0,08 мкг / г; Zn – 0,55 мкг / г.

Фармакотерапевтична група

Пеловіт-Р має потужну протизапальну, розсмоктуючу, десенсибілізаційну, биостимулюючу, знеболювальну, дренажувальну, бактерицидну та протигрибкову дію.

Пеловіт-Р – імуномодельовальний препарат, що активує процеси клітинного та гуморального імунітету. Стимулює регенерацію тканин, нормалізує репаративні процеси та регулює специфічні реакції організму щодо бактеріальної, вірусної та грибової інфекції. Сприяє швидкому загоєнню уражень шкіри без утворення рубців, прискорює процес епітелізації та усуває катаральні явища.

Механізм дії

Препарат Пеловіт-Р володіє двох стадійним механізмом дії.

Перша стадія – має протизапальну дію, в основі якої лежить активація метаболічних та енергетичних процесів, що призводить до зменшення та повної ліквідації запального набряку у вогнищі ушкодження, відновлення кровообігу та відновлення подачі кисню.

Друга стадія – має біостимуляційну дію, в основі якої лежить відновлення первісної структури пошкодженої тканини або органу.

Ці стадії динамічні, безперервно переходять одна в іншу або протікають одночасно, що призводить до відновлення цілісності органу та його нормального функціонування.

Показання до застосування

Захворювання	Спосіб застосуванняТерапевтичний ефект	
Онїхомїкоз (грибкове ураження нїгтьових пластин Trichophyton rubrum, Candida, Аспергиллез, змїшана грибкова їнфекція)	Примочки, додатково ванночки	Знищує ураженї грибокм клїтини, прискорює очищення вїд змертвїлих клїтин, стимулює рїст здорового нїгтю, антибактерїальна дїя
Врослї нїгті	Примочки	Зняття запалення, змїцнення нїгтьової пластини та стимуляція росту
Видаленї нїгті	Примочки	Стимулює швидкий рїст нїгтя та вїдновлення здорових тканин
Грибковї ураження шкїри стоп	Примочки, додатково ванночки	Видаляє ураженї грибокм клїтини шляхом вїдлущування, пїдсилює їмунїтет шкїри, сприяє формуванню нового здорового епїдермїсу
Дерматити та дерматози	Примочки та/або ванночки	Зменшення набрякlostї, седативний ефект, усунення свербїння
Гнїйничковї ураження, запалення бактерїального, вїрусного, хїрургїчного походження	Примочки	Кератолїтична дїя, усунення запалення шляхом виведення гною, антибактерїальна дїя
Набряки	Примочки та/або ванночки	Прискорює виведення токсинїв ї патологїчної рїдини
Травми, садни, порїзи	Примочки	Знеболювальна, бактерицидна та протизапальна дїя
Шпори та подагричнї вузли	Примочки та/або ванночки	Усуває бїль в п'ятах ї запалення в пов'язаних з ними сухожиллях, нормалїзує трофїку та прискорює виведення сечової кислоти з м'яких тканин
Мозоль	Примочки, додатково ванночки	Дезїнфекція та усунення мозольної рїдини, зменшення дїлянки змертвїлої шкїри

Рекомендація лікаря: для прискорення одруження допустимо поєднувати обидва види процедур, а також у комплексі рекомендується використовувати Подо-гель Пеловїт-Р

Спосіб застосування та дози

1 спосїб: Примочки. Не розводити, або почати з розведення 1:1. Накладати на зацікавлене мїсце та замотувати, щоб примочка залишалась вологою, на час вїд 30 хв до 2 годин та бїльше (на нїч) 1-2 рази/день. Курс 3 недїлі або до повного зникнення запальних явищ.

2 спосїб: Ванночки 1 раз/день. Додавання у ванночку на 2 л теплої води 80-100 мл препарату. Курс 8 процедур або до повного зникнення запальних явищ.

Препарат має накопичувальну дїю.

Особливї вказївки

- Дїтям у вїцї вїд 2 до 6 рокїв можливе використання препарату Пеловїт-Р в розведеннї 1:8
- Можливе застосування препарату Пеловїта-Р при вагїтностї та в перїод лактації.

– Рекомендовано людям з цукровим дїабетом

Протипоказання

Не застосовувати в мїсцях локалізації злоякісних пухлин.

Побїчнї дїї Не виявлено

Взаємодїя з їншими лїкарськими засобами Не вїдмїчена. Допускається застосування з їншими лїкарськими засобами при проведеннї комплексної терапії.

Умови зберїгання При температурї вїд +4 до +25 °C. Вмїст розкритого флакона можна використовувати протягом

усього терміну придатності.

Умови відпустки з аптек Без рецепта. Не є лікарським засобом.

Виробник: ТОВ «АКСИМЕД» Україна www.pelovit.com

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/106223.

Від 29.12.2010 р.