

Інструкція до застосування препарату Пеловіт-Р Остео-гель

Препарат для зовнішнього застосування.

Склад

Дієва речовина: Пеловіт-Р – орвано-мінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а також макро- і мікроелементи в природному співвідношенні.

Допоміжні речовини: очищена вода 18%, натуральні ефірні олії сосни та ялини 15%, алантоїн 10%, стабілізатор (Euxyl PE 9010) 4%, загусник (NATROSOL 250) 3%.

Хімічний склад “Пеловіт-Р” Водневий показник (pH) 7,72 Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм3 Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм3

Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм3 Натрій + 60,0 г/дм3

Калій + 0,9 г/дм3 Кальцій 2+ 2,5 г/дм3

Магній 2+ 8,03 г/дм3

Хлор – 91, 2 г/дм3

Сульфати 2- 2,1 г/дм3

Карбонати 2- 0,02 г/дм3

Бікарбонати 0, 317 г/дм3

Еп + 289,0

Вміст макро- та мікроелементів (мкг/г сухої речовини)

Al 0,78 мкг/г

B 29,7 мкг/г

Ba 0,99 мкг/г

Be 0,009 мкг/г;

Br 224000 мкг/г

Ca 5998 мкг/г

Co 0,005 мкг/г

Cr 3,79 мкг/г

Cu 0,51 мкг/г

Fe 23,67 мкг/г

I 3320 мкг/г

K 3697 мкг/г

Li 3,988 мкг/г

Mg 34250 мкг/г

Mn 2,09 мкг/г

Na 264700 мкг/г

Ni 2,2 мкг/г

P 21,3 мкг/г

S 9,47 мкг/г

Si 7,47 мкг/г

Sr 277,6 мкг/г

Ti 0,08 мкг/г

Zn 0,55 мкг/г

Фармакотерапевтична група

Пеловіт-Р гель має потужну протизапальну, розсмоктуючу, десенсибілізаційну, біостимуляційну, знеболювальну, дренажувальну та бактерицидну дію, що зберігається після закінчення курсу лікування завдяки своїм накопичувальним властивостям.

Механізм дії

Механізм дії Пеловіту-Р гелю – двостадійний. Динаміка стадій, що безперервно переходять одна в іншу, призводить до швидкого згасання болю та відновлення нормальної функціональності органу.

Перша стадія має протизапальну дію, в основі якої лежить активація метаболічних і енергетичних процесів, що призводить до зменшення та повної ліквідації запального набряку в осередку ушкодження, відновлення кровообігу та подачі кисню.

Друга стадія має біостимуляційну дію, в основі якої лежить відновлення первісної структури пошкодженої тканини чи органу.

Показання до застосування

Захворювання та стани

Травми та посттравматичні запалення сухожилків і м'язів, наслідки розтягнення зв'язок і перевантаження суглобів

Остеохондроз хребта

Міалгії травматичного, інфекційного або ревматичного походження

Наслідки переломів суглобів і кінцівок зі зменшеною консолидацією і болючим кістковим мозолем

Операції на суглобах

Терапевтичний ефект

Ліквідація набряку, відновлення порушеної трофіки, зміненої чутливості, відновлення метаболізму
Зменшення больового синдрому, викликане зупинкою дегеративних процесів в суглобових хрящах і біостимуляція тканин до регенерації
Ліквідація м'язового болю, пригнічення інфекції та відновлення імунітету, зменшення хронічного суглобового болю
Активізація процесу зрощення кісткових переломів, розсмоктування побічних утворень, прискорення процесу епітелізації ушкоджених тканин
Покращення передопераційного стану, підвищення ймовірності успішного результату операції, прискорення відновлення, сприяння швидкому загоєнню без утворення рубців

Післяопераційні контрактури та келоїдні рубці	Перешкоджання патологічному розростанню сполучних тканин, нормалізація репаративних процесів, стимуляція розсмоктування контрактур
Сколіоз	Перешкоджання подальшій деформації хребта та посиленню больового синдрому, стимулювання метаболічних процесів
Радикуліт	Усування болю по ходу нервових закінчень, стимулювання відновлення корінців спинного мозку, нормалізація чутливості та функції пов'язаних з ними органів
Артрити та артрози. Наслідки ревматичного артриту, поліартриту, ревматоїдний артрит, поліартрит в неактивній фазі, мікрокристалічний артрит (подагричний артрит, поліартрит)	Зменшення болю в суглобах, відновлення функціональності органу, зниження ризику виникнення ускладнень і повторення загострення
Ревматичні захворювання м'яких тканин (ентеропатії, епікондиліт, тендиніт, періартрит, мігаментіт, фасцит, апоневрозіт, включно з контрактурою Дюпюїтрена)	Нормалізація імунітету, стимуляція відновлення первісної структури тканин, ліквідація набряку, покращення кровообігу та постачання кисню в осередку захворювання
Бурсит	Ліквідація запалення слизової оболонки суглобової сумки плечових, ліктьових, колінних, кульшових суглобів
Міозит	Перешкоджання патологічним змінам при ураженні скелетних м'язів
Тендовагініт	Усування набряку біля сухожилкових оболонок кисті, лучезап'ястного суглоба, передпліччя, стопи, гомілковостопному суглобу та ахіллового сухожилля
Синовіт	Зменшення запалення синовіальної оболонки, зменшення об'єму ексудату в суглобі
Фіброзит	Усування болю всередині м'яких тканин поза суглобами, зменшення їх підвищеної стомлюваності, перешкоджання дегенеративним змінам сухожиль
Первинний остеоартроз (поліостеароз, олігоартроз, моноартроз, спондильоз, міжхребцевий остеохондроз) і вторинний остеоартроз (згодом дисплазії, артрити, травми, статичні порушення, гіпермобільність)	Перешкоджання дегенеративним ураженням хрящової тканини, суглобових поверхонь, стимуляція утворення здорових клітин
Остеохондропатії (хвороба Петерса, Кінбека, Кеніга, Келера I та Келера II 2, Шейєрмана-Мау), хронічна мікротравматизація	Нормалізація місцевого кровообігу, сприяння регенерації здорових клітин і виведення відмерлих утворень, спричинених мікротравмами
Хвороба Бехтєрєва в фазі ремісії	Покращення метаболізму в крижово-клубових зчленуваннях, суглобах хребта, паравертебральних м'яких тканинах, перешкоджання загостренню хвороби
Артропатії при не ревматичних захворюваннях (пов'язані з ендокринними захворюваннями – мікседематозні, клімактеричні)	Усування болю шляхом рефлекторного впливу на причину) і виникнення
Остеомієліт хронічний, гематогенний (крім туберкульозного)	Усування болю шляхом активізації процесів клітинного та гуморального імунітету, зменшення запалення, пригнічення патологічних бактерій в кістках і кістковому мозку, сприяння виведенню продуктів їх життєдіяльності
Неврити, ішіас	Зменшення впливу запалення на нервові тканини, нормалізація чутливості та рухових функцій керованих ними кінцівок і органів
Люмбаго	Зменшення гострого болю в нижній частині спини, зняття місцевого перенапруження, перешкоджання утворенню гриж і зміщення міжхребцевих дисків, зменшення вроджених аномалій хребців
Шпори та подагричні вузли	Усування болю в п'ятах і запалення в пов'язаних з ними сухожиллях, нормалізація трофіки та прискорення виведення сечової кислоти з м'яких тканин

Варикозне розширення вен

Хвороба втомлених ніг

Покращення стану судин і дрібних капілярів шляхом перешкоджання їх подальшим патологічним змінам
Усування відчуття тяжкості та розпирання в ногах, покращення загального самопочуття та сну

Спосіб застосування

Застосовувати зовнішньо, шляхом нанесення на ушкоджений орган від 5 разів в день. Курс лікування від 10 днів. Препарат має накопичувальну дію.

Застосування в педіатрії

Дітям у віці від 2 років можна застосовувати препарат Пеловіт-Р гель до 3 разів на день. Препарат не містить штучних барвників.

Застосування при вагітності та лактації

Препарат Пеловіт-Р можна застосовувати під час вагітності та в період лактації.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Взаємодії з іншими лікарськими препаратами не відмічено. Допускається застосування з іншими лікарськими засобами при проведенні комплексної терапії.

Протипоказання

Не застосовувати в місцях локалізації злоякісних пухлин.

Побічна дія

Небажаних ефектів препарату не виявлено.

Передозування

Випадків передозування не зафіксовано.

Умови зберігання

Препарат рекомендується зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +4 до +25°C. Вміст відкритого пакування можна використовувати протягом усього терміну придатності.

Виробник: ТОВ АКСИМЕД Україна www.pelovit.com