

Пеловіт-Р Гастро

- Виразка, гастрит
- Холецистит
- Панкреатит
- Ентероколіт
- Коліт

Форма випуску

Препарат для перорального застосування у полімерному флаконі із захисним ковпачком та мірним стаканчиком. Об'єм 200 мл. У картонній коробці із інструкцією.

Склад

Повністю натуральний препарат. Дієва речовина: Пеловіт-Р (унікальний органіномінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, та макро- та мікроелементи у природному співвідношенні).

Хімічний склад

Водневий показник (рН) 7,72
Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм³
Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм³
Сухий залишок
(мінералізація) 157,8 г/дм³
Натрій + 60,0 г/дм³
Калій + 0,9 г/дм³

Кальцій 2+ 2,5 г/дм³
Магній 2+ 8,03 г/дм³
Хлор- 91,2 г/дм³
Сульфати 2 2,1 г/дм³
Карбонати 2 0,02 г/дм³
Бікарбонати 0,317 г/дм³ Еп +289,0

Зміст макро та мікроелементів (мкг/г сухої речовини)

Al – 0,78 мкг/г	Co – 0,005 мкг/г	Li – 3,988 мкг/г		
B – 29,7 мкг/г	Cr – 3,79 мкг/г	Mg – 34250 мкг/г	S – 9,47 мкг/г	
Ba – 0,99 мкг/г	Cu – 0,51 мкг/г	Mn – 2,09 мкг/г	Si – 7,47 мкг/г	Ti – 0,08 мкг/г
Be – 0,009 мкг/г	Fe – 23,67 мкг/г	Na – 264700 мкг/г	Sr – 277,6 мкг/г	Zn – 0,55 мкг/г
Br – 224000 мкг/г	I – 3320 мкг/г	Ni – 2,2 мкг/г		
Ca – 5998 мкг/г	K – 3697 мкг/г	P – 21,3 мкг/г		

Фармакотерапевтична група

Протизапальний, розсмоктуючий, десенсибілізаційний, біостимуляційний знеболювальний, дренальний, бактерицидний засіб, дія якого зберігається після закінчення курсу лікування завдяки своїм накопичувальним властивостям.

Фармакотерапевтична дія

Механізм дії Пеловіт-Р Гастро 2-х стадійний. Динаміка стадій, що безперервно переходять одна в іншу, призводить до швидкого згасання болю і відновлення нормальної функціональності органу.

1 стадія – протизапальна, в основі якої активізація біохімічних ферментативних обмінних процесів у клітинах запаленого органу та необхідних для цього енергетичних процесів (накопичення та витрачання на метаболічні потреби макроергів АТФ). Це призводить до зменшення та повної ліквідації запального набряку в осередку ушкодження, відновлення кровообігу та подачі кисню.

2 стадія – біостимуляційна, основу якої відновлення початкової структури пошкодженого органу під впливом мікроелементного комплексу.

Виразкова хвороба шлунка

Забирає біль, почуття тяжкості, печію, нормалізує кислотність.

Гепатит А, В, С, D	Відновлює сили та апетит, прибирає тяжкість та дискомфорт у ділянці печінки.
Невірусні форми гепатиту, зокрема. НЖХП	Коригує роботу імунної системи, покращує виведення токсичних продуктів метаболізму.
Холецистит	Знеболює, прибирає присмак гіркоти у роті.
Панкреатит	Знімає біль, нормалізує травлення.
Коліт	Зменшує біль, тяжкість у животі, здуття, метеоризм. Нормалізує травлення, послаблює.
Ентероколіт	Знімає болючі відчуття, тяжкість у животі, метеоризм. Нормалізує стілець.
Закріп	Регулює кишкову моторику, має проносну дію.
Харчові отруєння	Прискорює детоксикацію, відновлює здорову флору.
Пієлонефрит	Зменшує мікробно-запальний процес.
Травми та ураження шлунка та кишківника	Знімає запалення. Сприяє відновленню структури та нормальному функціонуванню органу.
Відновлення шлунково-кишкового тракту після захворювань та операцій	Стимулює регенерацію, забезпечує мікроелементами для нормальної роботи ШКТ, посилює компенсаторні можливості організму.

Спосіб застосування: перорально.

– дорослим та дітям від 12 років по 15 мл (1 ст.л.) на 1 склянку теплої води. Курс: приймати 2 рази на день до їди протягом 10 днів. За тиждень лікування повторити.

– Дітям з 4-х років по 7,5 мл (0,5 ст.л.) на 1 склянку теплої води. Курс: 2 рази на день до їди протягом 10 днів. За тиждень лікування повторити.

Багаторазовими курсами для повного зникнення запальних явищ або продовження періоду ремісії хронічних захворювань.

Застосування при вагітності та годуванні груддю: препарат безпечний.

Протипоказання: злоякісні новоутворення та стани після операцій з видалення злоякісних пухлин шлунково-кишкових органів.

Побічна дія: не виявлено.

Передозування: не помічено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами допускається застосування з іншими лікарськими засобами під час проведення комплексної терапії.

У недоступному для дітей місці при t від +4° до +25°C. Вміст відкритого флакона використовувати протягом усього терміну придатності. Допускається наявність невеликого нерозчинного хімічно-інертного осаду, що не впливає на властивості препарату.

Умови продажу Без рецепта.

Виробник: ТОВ Аксимед