

Пеловіт-Р Класичний

- Хвороби опорно-рухового апарату **Пеловіт-Р Класичний**
- Хвороби опорно-рухового апарату
- Периферичної та центральної нервової системи
- Серцево-судинної системи
- Порушення обміну речовин
- Захворювання травних органів
- Стоматологічні захворювання
- Хвороби вуха, горла, носа та органів дихання
- Шкірних покривів
- Захворювання сечової та статеві системи
- Хірургічні захворювання

100% натуральний протизапальний і противірусний препарат без побічної дії

Склад

Повністю натуральний препарат. Містить унікальний органомінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а також макро- і мікроелементів в природному співвідношенні.

Пеловит-Р має потужний протизапальний, розсмоктуючий, десенсибілізаційний, біостимулюючий, знеболювальний, дренажний, бактерицидний ефект.

Імуномодуючий препарат Пеловіт-Р, активізує процеси клітинного і гуморального імунітету.

Стимулює регенерацію тканин, нормалізує репаративні процеси і регулює специфічні реакції організму на бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції.

Сприяє швидкому загоєнню ерозивних уражень слизових оболонок без рубців, прискорює процес епітелізації та усуває катаральні явища.

Використовується у вигляді компресів, примочок, лосьйонів, обгортань, зрошень, полоскань, крапельно, для фізіотерапевтичних процедур, ванночок, а також біостимуляційних добавок до ванн.

Хімічний склад Пеловіт-Р

Водневий показник (рН) 7,72 Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм³ Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм³ Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм³ Натрій+ 60,0 г/дм³ Калій+ 0,9 г/дм³ Кальцій²⁺ 2,5 г/дм³ Магній²⁺ 8,03 г/дм³ Хлор- 91,2 г/дм³ Сульфати²⁻ 2,1 г/дм³ Карбонати²⁻ 0,02 г/дм³ Бікарбонати- 0,317 г/дм³ Еп +289,0

Механізм дії

Препарат Пеловіт-Р має двоступеневий механізм дії.

Перша стадія має протизапальну дію, яка заснована на активації метаболічних і енергетичних процесів, що призводить до зниження і повного усунення запального набряку в вогнищі пошкодження, відновлення кровообігу і відновлення подачі кисню.

Друга стадія має біостимуляційну дію, яка заснована на відновленні первісної структури пошкодженої тканини або органу. Ці стадії динамічні, безперервно переходять одна в іншу або протікають одночасно, що призводить до відновлення цілісності органу і його нормального функціонування.

Мінеральний екстракт лікувальної грязі для відновного лікування та реабілітації

Містить макро- і мікроелементів (мкг/г сухої речовини):

Al-0,78; B-29,7; Ba-0,99; Be-0,009; Br-224000; Ca-5998; Co-0,005; Cr-3,79;Cu-0,51; Fe-23,67; I-3320; K-3697; Li-3,988; Mg-34250; Mn-2,09; Na-264700; Ni-2,2; P-21,3; S-9,47; Si-7,47; Sr-277,6; Ti-0,08; Zn-0,55

Периферичної та центральної нервової системи

Серцево-судинної системи

Порушення обміну речовин

Захворювання травних органів

Стоматологічні захворювання

Хвороби вуха, горла, носа та органів дихання

Шкірних покривів

Захворювання сечової та статеві системи

Хірургічні захворювання

100% натуральний протизапальний і протівірусний препарат без побічної дії

Склад

Повністю натуральний препарат. Містить унікальний органомінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а також макро- і мікроелементів в природному співвідношенні.

Пеловит-Р має потужний протизапальний, розсмоктуючий, десенсибілізуючий, біостимулюючий, знеболюючий, дренальний, бактерицидний ефект.

Імуномодуючий препарат Пеловіт-Р, активізує процеси клітинного і гуморального імунітету.

Стимулює регенерацію тканин, нормалізує репаративні процеси і регулює специфічні реакції організму на бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції.

Сприяє швидкому загоєнню ерозивних уражень слизових оболонок без рубців, прискорює процес епітеліалізації і усуває катаральні явища.

Використовується у вигляді компресів, примочок, лосьйонів, обгортань, зрошень, полоскань, крапельно, для фізіотерапевтичних процедур, ванночок, а також біостимулюючих добавок до ванн.

Хімічний склад Пеловіт-Р

Водневий показник (рН) 7,72 Загальна жорсткість 785,0 мг-екв/дм3 Загальна лужність 5,2 мг-екв/дм3 Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм3 Натрій+ 60,0 г/дм3 Калій+ 0,9 г/дм3 Кальцій2+ 2,5 г/дм3 Магній2+ 8,03 г/дм3 Хлор- 91,2 г/дм3 Сульфати2- 2,1 г/дм3 Карбонати2- 0,02 г/дм3 Бікарбонати- 0,317 г/дм3 Еп +289,0

Механізм дії

Препарат Пеловіт-Р має двоступеневий механізм дії.

Перша стадія має протизапальну дію, яка заснована на активації метаболічних і енергетичних процесів, що призводить до зниження і повного усунення запального набряку в вогнищі пошкодження, відновлення кровообігу і відновлення подачі кисню.

Друга стадія має біостимулюючу дію, яка заснована на відновленні первісної структури пошкодженої тканини або

органу. Ці стадії динамічні, безперервно переходять одна в іншу або протікають одночасно, що призводить до відновлення цілісності органу і його нормального функціонування.

Мінеральний екстракт лікувальної грязі для відновного лікування та реабілітації

Містить макро- і мікроелементів (мкг/г сухої речовини):

Al-0,78; B-29,7; Ba-0,99; Be-0,009; Br-224000; Ca-5998; Co-0,005; Cr-3,79; Cu-0,51; Fe-23,67; I-3320; K-3697; Li-3,988; Mg-34250; Mn-2,09; Na-264700; Ni-2,2; P-21,3; S-9,47; Si-7,47; Sr-277,6; Ti-0,08; Zn-0,55

Дозування та застосування

Захворювання опорно-рухового апарату Травми, синці. Усуває набряки, трофічні порушення, зміни чутливості. Активізує процес злиття переломів кісток. Розтягнення зв'язкового апарату.

Остеохондроз хребта. Сколіоз. Неврит. Радикуліт. Артрит і артроз. Наслідки перенесеного ревматоїдного артриту або поліартриту, ревматоїдного артриту або поліартриту в неактивній фазі, мікрокристалічного артриту (подагричний артрит або поліартрит).

Захворювання Бехтерева в ремісії.

Остеоартроз первинний (поліостеароз, олігоартроз, моноартроз, спондильоз, міжхребцевий остеохондроз) і вторинний (згодом дисплазія, артрит, травми, статичні порушення, а також гіпермобільність)

Артропатія при неревматичних захворюваннях (пов'язаних з ендокринними захворюваннями- мікседематоз, клімактеричні). Остеохондропатія (хвороба Пітерса, Кінбека, Кеніга, Келера 1 і 2, Шермана-Мау).Післяопераційні контрактури і келоїдні рубці. Операції на суглобах. Наслідки переломів суглобів і кінцівок зі зниженою консолидацією і болючою кістковою мозолем.М'які тканини (міозит, ентеропатія, включаючи епікондиліт, тендиніт, тендовагиніт, синовіт, бурсит, периартрит, мігаментіт, фасцити, апоневрозіти, включаючи контрактури Діпюїтрена). Хронічний остеомієліт, гематогенний (крім туберкульозного). Шпори і подаграчні вузли. Варикозне розширення вен, хвороба втомлених ніг

Захворювання ЛОР-органів Гайморит Риніт

Аденоїди

Примочки, компреси, обгортання. Пелоліт-Р нагрівають до +50 ° С в розведенні 1: 1 або без розведення. Примочка накладається на місце найбільшого болю і ретельно загортають на час від 30 хвилин до 2 г.Додатково місцеві ванночки або додавання 0,5 л Пеловіт-Р у ванну на 20-30 хв. Курс 12-15 пр, у літніх людей під наглядом лікаря, ванни t + 32-36 ° С.

Примочки, компреси, обгортання. Пелоліт-Р нагрівають до +50 ° С в розведенні 1: 1 або без розведення. Примочка накладається на місце найбільшої болю і ретельно загортають на час від 30 хвилин до 2 г.Додатково місцеві ванночки або додавання 0,5 л Пеловіт-Р у ванну на 20-30 хв. Курс 12-15 пр, у літніх людей під наглядом лікаря, ванни t + 32-36 ° С.

Капати в ніс або промивання теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3, 4-5 разів на день. На ніч укладають турундочку, змочену розведеним теплим препаратом. Курс лікування становить 10-14 днів або до повного зникнення запальних явищ, 1-2 місяці.

Крапельно в ніс і полоскання горла теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3, 5-6 разів на день. На ніч укладають турундочку, змочену розведеним теплим препаратом. При аденоїдах курс лікування становить 1-2 місяці або до повного зникнення запальних явищ. В результаті застосування препарату поліпшується носове дихання, припиняються виділення з носа, загострюється слух, поліпшується сон. Крапельний в вухо теплий (+ 37-39 ° С) розчин

Отити При зовнішньому і середньому середовищі отиту (катаральний, гнійний)

Фарингіт Ангіна (гострий тонзиліт): катаральна, лакунарна, фолікулярна і флегмозна на тлі медикаментозного лікування. Грип

ГРВІ

Вагітним під час передпологової підготовки і годуючим матерям з метою підвищення імунітету і профілактики бактеріальних вірусних інфекцій.

Стоматологічні захворювання Стоматит (афтозний, грибковий). Гінгівіт (запалення ясенного краю).

Карієс.

Пародонтоз.

Зараження альвеол.

Кандидоз ротової порожнини і горла.

До і після хірургічних втручань в стоматології. При травмах ротової порожнини.

Гіперестезія зубів. Зубний біль. Глосит.

При носінні протезів.

Дерматологічні захворювання 1 Дерматит. Плакуха екзема.

Діатез.

Екзема всього тіла.

Екзема рук і ніг.

Псоріаз

Пролежні

Пеловіт-Р з кип'яченою водою при розведенні 1: 1 дві краплі в вухо 4-5 разів на день. На ніч укладають турундочку, змочену розведеним теплим препаратом. Курс лікування становить 3-5 днів або до повного зникнення запальних явищ.

Полоскання горла теплим (+ 37-39 ° C) розчином Пелоніт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3, 4-5 разів на добу. Курс лікування становить 7-10 днів або до повного зникнення запальних явищ. Під час лікування препаратом руйнуються стійкі вірусобактеріальні асоціації, знімаються явища загальної інтоксикації, зменшується біль при ковтанні.

Полоскання горла теплим (+ 37-39 ° C) розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3, тричі на день. На ніч закладати турундочку, змочену нерозведеним теплим препаратом. Курс лікування – 10 днів.

Полоскання ротової порожнини розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3 при температурі + 38-40 ° C або без розведення, протягом 30-40 секунд 5-8 разів на день. Курс лікування становить 1-2 тижні. При необхідності курс лікування слід продовжити. Регулярне полоскання рота 5-8 разів на день протягом тижня призводить до швидкого зникнення набряків і гіперемії ясен, зникнення афт, припинення больових відчуттів, зникає неприємний запах з рота. Труднощі в їжі і носінні зубних протезів зникають.

У деяких випадках на місце запалення прикладають змочений марлевий тампон Пеловіт-Р.

Для профілактики захворювань порожнини рота рекомендується використовувати Пеловіт-Р 1-2 рази на день.

1 спосіб: Примочки, компреси, ванночки розчином Пелоліт-Р з кип'яченою водою. Почніть з розведення 1: 3, поступово збільшуючи концентрацію до 1: 1. Після процедури руки (ноги) омивають чистою водою і зволожують кремом. Вранці та ввечері. Курси 12-15 процедур, з тижневим інтервалом, до повного одужання. 2 метод:

Ванни (+ 36-37 ° C) перед сном протягом 20-30 хвилин. Додавання до ванни 1 л Пеловіт-Р.

Зволожують шкіру після ванни кремом і відпочивають по 40-60 хвилин. Три ванни на тиждень протягом місяця.

Схоже на лікування екземи. Додатково УФО + грязьові програми.

Компреси, примочки, обтирання. Почніть з розведення 1: 5, поступово збільшуючи

СікозФурунку-ли

Акне

Трофічні виразки гомілки у пацієнтів з варикоз-ним розширенням вен.

Грибкові уражен-ня шкіри ніг.

Парез і геміпарез Стан слабкості груп м'язів.

Опіки (12 градусів, в тому числі сонячні).

Себорея (підвищена секреція сальних залоз шкіри). Алопеція (випадання волосся).

Захворювання жіночої статеві області ІХвороби вульви

Запалення піхви, шийки матки. Хронічний сальпінгіт і сальпінгоофорит. Хронічний пара- і периметрит. Ендоцервіцит.Хронічний метрит і ендометрит. Вагінальний кандидоз.

Менструальна дисфункція

Запальні захворювання вульви і піхви у дітей від 6 до 14 років.

Хронічний аднексит, гіпофункція яєчників, безпліддя.

концентрацію до 1: 1.

Компрес або примочки з нерозведеним теплим Пеловіт-Р на ніч. Вранці повторіть процедуру для очищення шкіри від гнійних виділень. Для посилення антибактеріальної дії на склянку Pelovit-R додайте 5-7 крапель 2% спиртової настоянки йоду. При великих ураженнях ванни з додаванням 1 л. Пеловіт-Р тричі на тиждень.

Компрес або примочки нерозведеним теплимПеловіт-Р, укутуючи і зберігаючи тепло, 2 рази на день, вранці і ввечері. Після очищення поверхні рани і появи рожевих грануляцій, змащуйте поверхню 50% прополісним маслом до повної епіталізації. При випадках глибокого пошкодження шкіри гомілки, контролюйте згортання крові і проведіть раціональну антикоагулянтну терапію.

Примочки протягом трьох тижнів, до повного відлучення пошкоджених шарів шкіри Постійне протирання шкіри з метою запобігання гнійничкових уражень шкіри та збереження активного кровообігу

Холодні примочки нерозведеним препаратом до зникнення больового синдрому і почервоніння. Переконайтеся, що протягом всієї процедури пов'язка холодна.

У щойно вимите волосся втирайте теплий + 37-39 ° С нерозбавлений препарат в шкіру голови, зберігаючи тепло, промиваючи теплою водою через 40 хвилин. Курс 10 процедур через день. Промивання або промивання теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3, 4 рази на добу. Курс 3-5 днів або до повного зникнення запальних явищ.

1 спосіб: Тампонада теплою +37-39 ° С розчину Пеловіт-Р з кип'яченою водою в розведенні 1: 32 спосіб: Спринцювання або зрошення теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3.

Ванни + 37-39 ° С з 1 л Пеловіт-Р вдень або перед сном, 20-30 хв.

1 спосіб: Зрошення теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 5 за допомогою катетера. 2: Ванни + 37-39 ° С з 1 л Пеловіт-Р вдень або перед сном, 20-30 хв.

1 спосіб: Зрошення теплим +37-39 ° С розчином Пеловіт-Р кип'яченою водою в розведенні 1: 3.Курс 12-15 процедур.

2 метод:

Електрофорез з обох полюсів: розчин наноситься на лікарські прокладки з фільтрувального паперу, розмір яких відповідає гідрофільним прокладкам електродів. Щодня. Після кожної процедури відпочивайте 40 хв.

При менструаціях процедури продовжують.

Хронічні запальні захворювання придатків матки.

Тріщини прямої кишки

Для світловолосих і світлошкірих людей (у яких підвищена чутливість до високих концентрацій солей) рекомендується починати використовувати в розведенні 1: 5, поступово зменшуючи розведення.

Застосування в педіатрії

Дітям у віці від 2 до 6 років можна застосовувати препарат Пеловіт-Р при розведенні 1: 8 при теплій (+ 37-39 ° С) кип'яченій воді.

Застосування при вагітності та лактації

Можливе застосування препарату Пеловіт-Р під час вагітності та лактації.

Протипоказання

Не застосовувати в місцях локалізації злоякісних пухлин.

Побічні ефекти

Побічних ефектів препарату не виявлено.

Передозування

Не зафіксовано

Зберігання

При температурі 5°-25°С

Виробник: ТОВ Аксімед pelovit.com

1 спосіб: Електрофорез з інтравагінальним введенням теплового +37-39 ° С розчину Пеловіт-Р з кип'яченою водою в розведенні 1: 1, в кількості 120-140 мл шприцом Жане. Електроди накладають на крижову і надлобкову зони, щільність струму 0,05-0,08 мА / см Тривалість процедури 15-20 хвилин. Курс 12-15 процедур.2 метод:

Поєднання електрофорезу з вагінальним вібраційним масажем на частоті 65-68 Гц. протягом 10-15 хвилин. Курс 12-15 процедур.

Примочку на тріщину теплим + 37-39 ° С розчином Пеловіт-Р з кип'яченою водою в розведенні 1: 3.